Esercizi di Calcolo delle Probabilità e Statistica

a.a.2023/2024
15/07/2024

Esercizio 1 Il numero di bottiglie di vino bianco vendute in un giorno dall'enoteca di quartiere è una v.a. di Poisson di parametro $\lambda = 5$, mentre il numero di bottiglie di vino rosso vendute in un giorno è una v.a. di Poisson di parametro $\lambda = 3$. Si considerino il numero di bottiglie di vino rosso e il numero di bottiglie di vino bianco come vv.aa. indipendenti così come il numero di bottiglie di vino dello stesso colore vendute in giorni diversi.

1. Calcolare la probabilità che in un qualsiasi giorno di apertura venga venduta una sola bottiglia di rosso.
2. Calcolare la probabilità che in un qualsiasi giorno di apertura vengano vendute almeno 3 bottiglie.
3. Se l' esercente mettesse da parte 2 euro per ciascuna bottiglia di vino venduta, stimare la probabilità che in un anno lavorativo di 255 giorni l' esercente accantoni almeno 5000 euro sapendo che se $\xi \stackrel{d}{=} \text{Poi}(\lambda)$ e $t > \lambda$,

$$\mathbb{P}\{\xi \geq t\} \leq e^{-\lambda} \left(\frac{e\lambda}{t}\right)^t . \quad (1)$$

4. Dimostrare la (1) usando la disuguaglianza di Markov per la v.a. $e^{s\xi}$, $s > 0$ e successivamente minimizzando rispetto ad s .

Soluzione:

1. Sia X la v.a. che indica il numero di bottiglie di rosso vendute in un giorno. Allora,

$$\mathbb{P}\{X = 1\} = e^{-3}3 .$$

2. Sia Y la v.a. che il numero di bottiglie di bianco vendute in un giorno. Allora, $Z := X + Y$ è la v.a. che indica il numero totale di bottiglie vendute in un giorno. Poiché X e Y sono vv.aa. con distribuzione di Poisson rispettivamente di parametri $\lambda_r = 3$ e $\lambda_b = 5$, Z è una v.a. con distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = \lambda_r + \lambda_b = 8$ (*dimostrarlo!*). Perciò, se $\{Z \geq 3\}$ è l'evento che vengano vendute almeno 3 bottiglie al giorno,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Z \geq 3\} &= 1 - \mathbb{P}\{Z \leq 2\} = 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-8} \frac{8^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-8} (1 + 8 + 32) = 1 - 41e^{-8} . \end{aligned}$$

3. Poniamo $N := 255$. Se Z_i indica il numero di bottiglie vendute il giorno i , la collezione di vv.aa. $\{Z_i\}_{i=1}^N$ è composta da vv.aa. indipendenti identicamente distribuite tali che ciascuna è distribuita secondo la distribuzione di probabilità di Poisson di parametro $\lambda = 8$. Perciò, indicando $S := \sum_{i=1}^N Z_i$ la v.a. che rappresenta il numero di bottiglie vendute in un anno di esercizio e con $W := 2S$ la v.a. che rappresenta la somma di denaro complessivamente accantonata per la vendita delle bottiglie in un anno di esercizio, poiché $S \stackrel{d}{=} Poi(8N)$ (*dimostrarlo!*) e $8N = 2040 < 2500$, per la (1) si ha

$$\mathbb{P}\{W \geq 5000\} = \mathbb{P}\{S \geq 2500\} \leq e^{-2040} \left(\frac{e2040}{2500} \right)^{2500}.$$

4. Per ogni $s > 0$, poiché $\mathbb{R}_+ \ni x \mapsto e^{sx} \in \mathbb{R}_+$ è una funzione monotona non decrescente, $\mathbb{P}\{\xi \geq t\} = \mathbb{P}\{e^{s\xi} \geq e^{st}\}$. Allora per la disuguaglianza di Markov si ottiene

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{e^{s\xi} \geq e^{st}\} &\leq e^{-st} \mathbb{E}[e^{s\xi}] = e^{-st} \sum_{k \geq 0} e^{sk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-st-\lambda} \sum_{k \geq 0} \frac{(e^s \lambda)^k}{k!} = \exp\{-[st + \lambda(1 - e^s)]\} \end{aligned}$$

per tutti i valori di $s > 0$ e in particolare per quello che rende minima questa espressione, cioè per $s = \log \frac{t}{\lambda}$, da cui la tesi.

■

Esercizio 2 Sia (X, Y) un vettore aleatorio uniformemente distribuito sull'insieme

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \vee |y| \leq 1, y \leq x^2\}.$$

1. Calcolare la costante di normalizzazione della densità di probabilità congiunta.
2. Verificare se le componenti del vettore sono indipendenti e in caso contrario calcolare la densità della probabilità condizionata della componente Y rispetto alla componente X .
3. Calcolare la matrice di covarianza di (X, Y) , ovvero

$$\begin{pmatrix} Cov(X, X) & Cov(X, Y) \\ Cov(Y, X) & Cov(Y, Y) \end{pmatrix}.$$

Soluzione:

1. La costante di normalizzazione c della densità di probabilità di (X, Y) è pari all'inverso della differenza tra l'area del quadrato $Q := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \vee |y| \leq 1\}$ e quella della regione del piano $C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$. Ovvero, poiché

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy = \int_{-1}^1 dx (1 - x^2) = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3},$$

$$c = \left(4 - \frac{4}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{8}.$$

2. Le densità di probabilità marginali di (X, Y) sono

$$f_X(x) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(x) \frac{3}{8} \int_{-1}^{x^2} dy = \frac{3}{8} (x^2 + 1) \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$$

e

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{3}{8} \left[2\mathbf{1}_{[-1,0]}(y) + \left(\int_{-1}^{-\sqrt{y}} dx + \int_{\sqrt{y}}^1 dy \right) \mathbf{1}_{[0,1]}(y) \right] \\ &= \frac{3}{4} (\mathbf{1}_{[-1,0]}(y) + (1 - \sqrt{y}) \mathbf{1}_{[0,1]}(y)) . \end{aligned}$$

Da cui segue che le vv.aa. X e Y non sono tra loro stocasticamente indipendenti. Infatti, scegliendo per esempio il punto $(0, \frac{1}{2})$ si ottiene

$$f_X(0) f_Y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \neq f_{(X,Y)}\left(0, \frac{1}{2}\right) = 0 .$$

Allora,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\mathbf{1}_{\{(u,v) \in [-1,1]^2 : |x| \leq 1, -1 \leq y \leq x^2\}}(x,y)}{x^2 + 1} .$$

3. Poiché f_X è una funzione pari, quindi $\mathbb{R} \ni x \mapsto x f_X(x) \in \mathbb{R}$ è dispari, e $[-1, 1]$ è un intervallo simmetrico si ha che

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} dx f_X(x) x = \frac{3}{8} \int_{-1}^1 dx (x^2 + 1) x = 0 ,$$

mentre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= \int_{\mathbb{R}} dy f_Y(y) y = \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} + \int_0^1 dy y (1 - \sqrt{y}) \right) \\ &= \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \int_0^1 dy y^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{3}{4} \left(-\frac{2}{5} \right) = -\frac{3}{10} . \end{aligned}$$

Inoltre,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \frac{3}{8} \int_D dx dy xy \\ &= \frac{3}{8} \left[\int_Q dx dy xy - \int_C dx dy xy \right] . \end{aligned}$$

Notiamo che, integrando funzioni dispari su un intervallo pari,

$$\int_Q dx dy xy = \int_{-1}^{-1} dx x \int_{-1}^1 dy y = 0 .$$

Inoltre, per lo stesso motivo,

$$\int_C dx dy xy = \int_{-1}^1 dx x \int_{x^2}^1 dy y = \int_{-1}^1 dx x (1 - x^2) = 0 .$$

Perciò $\mathbb{E}[XY] = 0$, quindi

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0 ,$$

ovvero X e Y sono vv.aa. scorrelate sebbene non indipendenti. Non resta che calcolare $\mathbb{E}[X^2]$ e $\mathbb{E}[Y^2]$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \frac{3}{8} \int_{-1}^1 dx (x^2 + 1) x^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{5} \\ \mathbb{E}[Y^2] &= \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3} + \int_0^1 dy (1 - \sqrt{y}) y^2 \right) = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right) = \frac{2}{7} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \text{Cov}(X, X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & \text{Cov}(Y, Y) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \mathbb{E}[X^2] & 0 \\ 0 & \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}^2[Y] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & \frac{2}{7} - \frac{9}{100} \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

■

Esercizio 3 Supponiamo di avere una successione di vv.aa. $\{X_n\}_{n \geq 0}$ sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ che descrive una catena di Markov con 4 stati, $S = \{1, 2, 3, 4\}$ tale che: dallo stato 1 si transisce con probabilità $\frac{1}{6}$ agli stati 2 e 3, e si resta nello stesso stato con probabilità $\frac{2}{3}$. Dallo stato 2, si transisce con probabilità $\frac{1}{2}$ agli stati 1 e 3. Dallo stato 3 si transisce con probabilità $\frac{1}{2}$ agli stati 2 e 4. Dallo stato 4 si transisce con probabilità $\frac{1}{6}$ agli stati 2 e 3, e si resta nello stesso stato con probabilità $\frac{2}{3}$.

1. Elencare le classi di equivalenza degli stati e calcolarne il periodo.
2. Calcolare $\mathbb{P}(\{X_3 = 2\} | \{X_1 = 3\})$ e, assumendo come distribuzione iniziale quella uniforme, calcolare $\mathbb{E}[X_2]$.
3. Se $\{P_{i,j}\}_{i,j=1,\dots,4}$ indica la matrice delle probabilità di transizione tra gli stati della catena, calcolare se esistono: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : X_{2n+1}(\omega) = 4\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (P_{3,2}^n + P_{3,4}^n)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{1,3}^{2n}$.

Soluzione:

1. La matrice delle probabilità di transizione tra gli stati della catena è

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

perciò la catena può essere rappresentata mediante il grafo diretto

da cui si deduce che esiste un'unica classe di stati comunicanti aperiodica.

2. Poiché la catena di Markov è omogenea

$$\mathbb{P}(\{X_3 = 2\} | \{X_1 = 3\}) = \mathbb{P}(\{X_2 = 2\} | \{X_0 = 3\}) = P_{3,2}^2.$$

Ma

$$P^2 = \begin{pmatrix} \frac{19}{36} & \frac{7}{36} & \frac{7}{36} & \frac{3}{36} \\ \frac{4}{12} & \frac{4}{12} & \frac{1}{12} & \frac{3}{12} \\ \frac{3}{12} & \frac{1}{12} & \frac{4}{12} & \frac{4}{12} \\ \frac{3}{36} & \frac{7}{36} & \frac{7}{36} & \frac{19}{36} \end{pmatrix},$$

Quindi, $P_{3,2}^3 = \frac{1}{12}$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_2] &= \sum_{i,j=1}^4 j \mathbb{P}(\{X_2 = j\} | \{X_0 = i\}) \mathbb{P}\{X_0 = i\} = \\
 &= \sum_{i,j=1}^4 \frac{1}{4} P_{i,j}^2 j = \frac{1}{4} \left(\frac{11}{6} + \frac{27}{12} + \frac{33}{12} + \frac{57}{18} \right) = \\
 &= \frac{1}{4} \frac{360}{36} = \frac{5}{2}.
 \end{aligned}$$

3. Poiché la catena di Markov descritta dalla matrice delle probabilità di transizione P è indecomponibile e aperiodica vale il teorema ergodico. Perciò,

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} P_{1,3}^{2n} &= \pi_3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{3,2}^n = \pi_2, \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} P_{3,4}^n &= \pi_4 = \sum_{i=1}^4 \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : X_0(\omega) = i\} P_{i,4}^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : X_n(\omega) = 4\},
 \end{aligned}$$

e pertanto $\lim_{n \rightarrow \infty} (P_{1,3}^n + P_{3,4}^n) = \pi_3 + \pi_4$, dove $\pi := (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)$ è la distribuzione di probabilità invariante per P , ovvero $\pi P = \pi$. Pertanto, risolvendo

$$\begin{cases} \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 = \pi_1 \\ \frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{6}\pi_4 = \pi_2 \\ \frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{6}\pi_4 = \pi_3 \\ \frac{2}{3}\pi_4 + \frac{1}{2}\pi_3 = \pi_4 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

si ha $\pi_1 = \pi_4 = \frac{3}{10}, \pi_2 = \pi_3 = \frac{1}{5}$.

■

Esercizio 4 Sia $\{X_i\}_{i \geq 1}$ una successione di v.v.a. stocasticamente indipendenti, subordinatamente alla conoscenza di un parametro Θ , con densità di probabilità condizionata marginale

$$f(x_i|\theta) = \sqrt{\frac{\theta}{2\pi}} \exp\left\{-\frac{\theta}{2}x_i^2\right\}, \quad x_i \in \mathbb{R}.$$

Supponendo che la densità a priori di Θ sia un'esponenziale di parametro 1, se si osservano i primi valori $x_1 = 2, x_2 = \sqrt{2}, x_3 = 1, x_4 = \frac{3}{2}$, della successione,

1. calcolare la densità di probabilità a posteriori di Θ e il suo punto di massimo;
2. calcolare la probabilità a posteriori dell'evento $\{\Theta > 2\}$;
3. calcolare valore atteso e varianza a posteriori della v.a. $Z = \Theta^2$.

Soluzione:

1. La densità a posteriori di Θ sarà pari a

$$\begin{aligned} & \pi\left(\Theta = \theta \mid (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(2, \sqrt{2}, 1, \frac{3}{2}\right)\right) = \\ & = K f_{\Theta}\left(x_1 = 2, x_2 = \sqrt{2}, x_3 = 1, x_4 = \frac{3}{2}\right) \pi_{\Theta}(\theta) \\ & = K f(x_1 = 2|\theta) f(x_2 = \sqrt{2}|\theta) f(x_3 = 1|\theta) f\left(x_4 = \frac{3}{2}|\theta\right) e^{-\theta} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}(\theta) \\ & = \frac{K}{(2\pi)^2} \theta^2 e^{-\theta\left[\frac{(4+2+1+\frac{9}{4})}{2}+1\right]} = \frac{K}{(2\pi)^2} \theta^2 e^{-\theta\left[\frac{45}{8}\right]}, \end{aligned}$$

e quindi è una $\Gamma\left(3, \frac{45}{8}\right)$. Perciò $K = (2\pi)^2 \left(\frac{45}{8}\right)^3 \frac{1}{2} = \pi^2 \frac{3^6 5^3}{2^8}$.

Il punto di massimo si ha per $\theta = \frac{16}{45}$.

2. Ponendo $\lambda = \frac{45}{8}$, integrando due volte per parti, la probabilità a posteriori dell'evento $\{\Theta > 2\}$ risulta allora pari a

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^3}{2} \int_2^{+\infty} d\theta \theta^2 e^{-\theta\lambda} &= \frac{1}{2} (4\lambda^2 + 4\lambda + 2) e^{-2\lambda} \\ &= (2\lambda^2 + 2\lambda + 1) e^{-2\lambda}. \end{aligned}$$

3. Il valore atteso a posteriori di Θ^2 è pari a

$$\frac{\lambda^3}{2} \int_0^{+\infty} d\theta \theta^4 e^{-\theta\lambda} = \frac{4!}{2\lambda^2} = \frac{2^8}{3^3 5^2};$$

il valore atteso a posteriori di Θ^4 è pari a

$$\frac{\lambda^3}{2} \int_0^{+\infty} d\theta \theta^6 e^{-\theta\lambda} = \frac{6!}{2\lambda^4} = \frac{2^{15}}{3^6 5^3}.$$

Perciò la varianza a posteriori di Θ è uguale a $\frac{2^{15}}{3^6 5^3} - \frac{2^{16}}{3^6 5^4} = \frac{2^{15}}{3^6 5^3} \left(1 - \frac{2}{5}\right)$.

■